



INSECTICIDA

POLVO SOLUBLE

RSCO-INAC-0101U-X0520-019-20.0

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% En Peso
INGREDIENTES ACTIVOS:	
ACETAMIPRID: (E)-N1-[(6-cloro-3-piridil)metil]-N2-ciano-N1-metilacetamidina (Equivalente a 200 g de ia/kg)	20.00%
INGREDIENTES INERTES:	
Dispersantes y vehículos	80.00%
	TOTAL 100.00%

- Características del Producto:

HELGAR es un insecticida que actúa sobre el sistema nervioso central de manera sistémica por contacto e ingestión, provocando un bloqueo irreversible de los receptores pos sinápticos en las plagas.



- Métodos para preparar y aplicar el producto:

- Es un producto de aplicación foliar.
- Corte la esquina del envase.
- Usar el equipo de protección adecuado.
- Agregue la mitad de la cantidad requerida de agua al tanque.
- Mida con una balanza la cantidad de **HELGAR** a utilizar, adicione la dosis completa.
- Agregue agua sin dejar de agitar, a fin de homogenizar.
- Para mejor rendimiento deberá de aplicarse evitando altas temperaturas y días con lluvia o con demasiada humedad.
- Evitar aplicar en sentido contrario a la dirección del viento.

- Recomendaciones de Uso:

Utilice **HELGAR** de acuerdo a las siguientes instrucciones

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS (g/ha)	OBSERVACIONES
Jitomate, Berenjena, Chile, Pimiento morrón, Papa, Okra, Tomate verde (7)	Paratrioza <i>(Bactericera cockerelli)</i>	200-350	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días al detectar una población homogénea de la plaga; volumen de aplicación 550-650 L de agua/ha.
Brócoli, Col de Bruselas, Col, Coliflor, Mostaza, Colza, Colinabo (7)	Pulgón de la col ó Pulgón cenizo de la col <i>(Brevicorine brassicae)</i>	200-300	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días cuando se detecte una población homogénea de la plaga; volumen de aplicación 300-400 L de agua/ha
Fresa, Frambuesa, Arándano, Zarzamora	<i>Thrips tabaci</i>	200-300	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días, volumen de aplicación 450-550L de agua/ha.

Tiempo de reentrada a la zona tratada: 12 horas después de la aplicación.

() Intervalo de Seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

- Compatibilidad

No se debe mezclar **HELGAR** con otros productos agroquímicos.

- Fitotoxicidad

HELGAR no es totóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de cuerdo a las recomendaciones.

- Almacenamiento

Conservar en un lugar fresco, seco y ventilado.