



BACTERICIDA Y FUNGICIDA

SUSPENSIÓN ACUOSA

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN (% p/p)
GLUCONATO DE COBRE (Equivalente a 60g de cobre metálico como i.a./L a 20°C)	35.676 %
DISOLVENTES	64.324 %

- Características del Producto:

GLUCOTRON Cu es un bactericida y fungicida de efecto preventivo y curativo contra bacterias fitopatógenas.

- Modo de Acción:

Actúa contra las bacterias rompiendo las membranas de las paredes celulares de las mismas. Una vez que la planta absorba el ion cobre, actúa de barrera interna para la entrada de agentes fitopatógenos.

Es un corrector de carencias del microelemento cobre (Cu) en los cultivos. Es de alta eficiencia por estar 100% acompanyado. No detiene el desarrollo vegetativo de los cultivos. No causa fitotoxicidad, no acartona, no mancha. Tiene buena sinergia con otros tipos de cobre y productos de otra naturaleza.

- Presentación Comercial:

Envase 1L

- Características Físicas:

Color: Azul verde

Densidad: 1.15 – 1.25

pH: 3.5 – 4.5



- Recomendaciones de Uso:

Es un producto completamente soluble en agua, para uso foliar en todo cultivo.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/ha)	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Jitomate, Tomate de cascara, papa, Tabaco, chile, berenjena.	Mancha bacteriana (<i>Xanthomonas campestris pv vesicatoria</i>)	3.0 – 5.0	Realizar dos aplicaciones al follaje con intervalos de 7 días. Iniciar las aplicaciones cuando se detecten los primeros síntomas.
Arándano, frambuesa, fresa, grosella, zarzamora.	Mancha angular (<i>Xanthomonas fragarie</i>)	3.0 – 5.0	Realizar tres aplicaciones a intervalos de 7 días. Iniciar las aplicaciones cuando se detecten los primeros síntomas.
Pepino, Calabaza, Calabacita, Melón, Sandía y Chayote.	Mancha angular (<i>Pseudomonas syringae</i>)	4.0 – 5.0	Realizar dos aplicaciones al follaje con intervalos de 7 días. Iniciar las aplicaciones cuando se detecten los primeros síntomas.
Aguacate	Mancha Angular (<i>Cercospora purpurea</i>)-	3.0 – 5.0	Realizar 2 – 3 aplicaciones en yema inchada y en prefloración cada 8 – 12 días en función de las necesidades del cultivo; Se recomienda un tratamiento antes de la parada invernal (a partir de 50% de la caída de las hojas).

- Fitotoxicidad

No causa fitotoxicidad, no acartona, y no mancha si se utiliza en las dosis aquí recomendadas.

- Incompatibilidad

Solo deberá mezclarse con productos registrados en los cultivos autorizados. Cuando se desconozca la compatibilidad de alguna mezcla, deberá hacer una prueba previa a pequeña escala.

- Manejo de Resistencia

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.